

1% Rely+On™ Virkon™ tablet-opløsning er stabil i 5 dage. Den anbefalede gode praksis er, at opløsningen fornyes dagligt.

Familj	Exempel	Familj	Exempel
Virus			
Herpesviridae	Herpes Simplex	Caliciviridae	Norwalk-like virus
Adenoviridae	Human Adenovirus	Coronaviridae	SARS virus
Picornaviridae	Polio Type 1	Paramyxoviridae	AI H5N1
Hepadnaviridae	Hepatitis B	Retroviridae	HIV Type I
Flaviviridae	Hepatitis C	Orthomyxoviridae	Swine Influenza A (H1N1)

Bakterier			
E. coli 0157	Listeria	Salmonella	Campylobacter
Klebsiella pneumonia	Streptococci	Pseudomonas	Shigella
Staphylococci (inkl. MRSA)	Clostridium sporogenes	Enterococcus faecalis (VRE)	

Jäster	
Candida albicans	

FÖRSTA HJÄLPEN

Generell anvisning: Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare om symptomen kvarstår eller om tvekan föreligger.

Inhalation: Avbryt exponeringen och placera personen i liggläge. Om personen har upphört att andas kan konstgjord andning och/eller syretillförsel bli nödvändig. Konsultera läkare.

Hudkontakt: Avlägsna omedelbart fuktiga klädpersedlar. Tvätta omedelbart av huden med rikligt med vatten. Tvätta kontaminerade klädpersedlar före återanvändning. Konsultera läkare.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.

Förtäring: Provocera ej kräkning. Tillkalla läkare omedelbart.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Som med alla desinfektionsmedel ska stänk från lösningen omedelbart tvättas bort från hud och ögon. Blanda inte lösningen med andra kemiska lösningar, förutom med sådana som tillverkaren rekommenderat.

PREPARERA INTE koncentrerade lösningar för senare upplösning. Rely+On™ Virkon™ tablet lösningen ska ej användas för desinfektion av medicintekniska produkter. Ytterligare säkerhetsföreskrifter finns tillgängliga på förpackningsetiketten; läs alltid dessa före användning. Bör ej användas för desinfektion av ytor avsedda för kontakt med livsmedel. Endast för yrkesmässig användning.

LAGRING

Förvara förpackningen tillsluten på en sval och torr plats. Förvara den beredda lösningen i rumstemperatur (15-25°) och utsätt den inte för direkt solljus. Behållaren för tabletten innehåller en torkmedelspåse som alltid ska förvaras i behållaren.

AVFALLSHANTERING

Rely+On™ Virkon™ tablet lösningen kan hällas ut i avlopp som står i förbindelse med kommunalt reningsverk i enlighet med lokala myndighetsföreskrifter. Lösningen får ej hällas ut i dagvattenavlopp. Töm Förpackningar och/eller överflödiga tabletter ska bortskaffas i enlighet med lokala bestämmelser.

Handelshuset Viroderm AB
Fabriksvägen 5
171 48 Solna
Tfn 08-37 37 12

Giftinformationscentralen (SE): +46 - 10 45 66 700
CHEMTREC EMEA: +44 20 3885 0382 (CCN 1001748) (24/7)

heimo	Esimerkki	heimo	Esimerkki
Virukset			
Herpesviridae	Herpes Simplex	Caliciviridae	Norwalk-like virus
Adenoviridae	Human Adenovirus	Coronaviridae	SARS virus
Picornaviridae	Polio Type 1	Paramyxoviridae	AI H5N1
Hepadnaviridae	Hepatitis B	Retroviridae	HIV Type I
Flaviviridae	Hepatitis C	Orthomyxoviridae	Swine Influenza A (H1N1)

Bakteerit			
E. coli 0157	Listeria	Salmonella	Campylobacter
Klebsiella pneumoniae	Streptococci	Pseudomonas	Shigella
Staphylococci (inc.MRSA)	Clostridium sporogenes	Enterococcus faecalis (VRE)	

Hiivat	
Candida albicans	

ENSIAPUTOIMENPITEET

Yleinen ohjeistus: Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Mikäli oireita tai jotain epäilyttävää ilmenee, on otettava yhteys lääkäriin.

Hengitys: Siirrettävä altistunut pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Mikäli potilaan hengitys on pysähtynyt: tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia. Otettava yhteys lääkäriin.

Ihokosketus: Riisuttava välittömästi tahrintunut vaatetus. Roiskeet huuhdeltava iholta välittömästi runsaalla vedellä. Pese tahrintuneet vaatteet ennen uudelleen käyttöä. Otettava yhteys lääkäriin.

Roiskeet silmiin: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja otettava yhteys lääkäriin.

Nieleminen: Ei saa oksennuttaa. Kutsu lääkäri välittömästi.

VAROTOIMENPITEET

Kuten kaikkien desinfektioaineiden kanssa, pese roiskeet iholta ja silmistä välittömästi. Älä sekoita käyttöliuosta muiden kemiallisten liuosten kanssa, paitsi sellaisten, joita valmistaja suosittaa. Älä valmista tiivistettyä liuosta myöhempiä laimennoksia varten. Rely+On™ Virkon™ tablets liuosta ei pidä käyttää lääketieteellisten laitteiden desinfektioon. Lisää varotoimenpiteistä pakkauksen etiketissä: lue ohjeet aina ennen käyttöä. Ei käytettäväksi pinnoille, joilla käsitellään elintarvikkeita. Ainoastaan ammattikäyttöön.

VARASTOINTI

Säilytä pakkaus suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytä valmistettu käyttöliuos huoneenlämmössä (15-25°C), mutta ei suoraan auringonpaisteessa. Tablettipakkauksessa on kuivausainepussi, joka on säilytettävä pakkauksessa koko ajan.

JÄTTEENKÄSITTELY

Rely+On™ Virkon™ tablets liuos voidaan kaataa viemäriin, joka kuuluu kunnalliseen puhdistusjärjestelmään. Liuosta ei saa kaataa suojaamattomiin vesijärjestelmiin. Tyhjat pakkaukset ja/tai ylijäämätabletit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Berner Oy, Hitsaajankatu 24,
FIN-00810 Helsinki
puh. 0206 90761
Myrkytyskeskus puh (FI): +358 - (09) 471 977 tai: +358-(09) 4711 as follows 0800 147 111 (Avoinna 24 t/vrk)
CHEMTREC EMEA: +44 20 3885 0382 (CCN 1001748) (24/7)

Familie	Eksempel	Familie	Eksempel
Vira			
Herpesviridae	Herpes Simplex	Caliciviridae	Norwalk-like virus
Adenoviridae	Human Adenovirus	Coronaviridae	SARS virus
Picornaviridae	Polio Type 1	Paramyxoviridae	AI H5N1
Hepadnaviridae	Hepatitis B	Retroviridae	HIV Type I
Flaviviridae	Hepatitis C	Orthomyxoviridae	Swine Influenza A (H1N1)

Bakterier			
E. coli 0157	Listeria	Salmonella	Campylobacter
Klebsiella pneumoniae	Streptococci	Pseudomonas	Shigella
Staphylococci (inc.MRSA)	Clostridium sporogenes	Enterococcus faecalis (VRE)	

Gærceller	
Candida albicans	

FØRSTEHJÆLP

Generelt råd: Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Hvis symptomer fortsat er til stede, eller i tvivlsfald, søges lægehjælp.

Indånding: Skadelidte fjernes fra eksponeringskilden og lægges ned. Hvis skadelidtes åndedræt er standset, kan kunstigt åndedræt og/eller ilttilførsel være nødvendig. Søg læge.

Hudkontakt: Fjern straks alt kontamineret tøj. Skyl straks huden med rigeligt vand. Alt kontamineret tøj skal vaskes, før det bruges igen. Søg læge.

Øjenkontakt: Skyl omgående med rigeligt vand og søg læge.

Indtagelse: Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge.

SIKKERHEDSTILTAG

Som med alle desinfektionsmidler skal stænk fra opløsningen straks vaskes af huden og fra øjnene. Må ikke blandes med andre kemikalier end dem som fabrikanten anbefaler. FORBERED IKKE koncentrerede opløsninger til senere fortynding. Rely+On™ Virkon™ tablets opløsninger må ikke anvendes til desinfektion af medicinsk udstyr.Yderligere sikkerheds forskrifter findes på pakningens etiket. Læs altid denne før anvendelse. Må ikke anvendes til desinfektion af overflader der kommer i kontakt med fødevarer. Må kun anvendes af fagpersonale.

OPBEVARING

Lukkede beholdere skal opbevares på et køligt og tørt sted. Opblandede opløsninger skal opbevares udenfor direkte sollys og ved rumtemperatur (15-25°). Tabletproduktbeholderen indeholder en tørremiddelpose, som altid skal beholdes i beholderen.

BORTSKAFFELSE

Rely+On™ Virkon™ tablets opløsninger kan hældes ud i vask og afløb der er forbundet med kommunalt rensningsanlæg, i henhold til lokale regulativer. Opløsninger må IKKE hældes ud i regnvandsafløb og alle ubeskyttede afløb. Tomme emballager og/eller overskydende tabletter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.

KEBO MED A/S
Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Tlf. 36 39 80 80
Giftlinjen (DK): +45 - 82 12 12 12
CHEMTREC EMEA: +44 20 3885 0382 (CCN 1001748) (24/7)

Tillverkare/Valmistaja/Producent:
Antec International Limited
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk CO10 2XD
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1787 377305
Fax: +44(0) 1787 310846
relyondisinfection@lanxess.com
www.relyondisinfection.com