



***"Inficerede sår er ofte svære at håndtere"***

*"Det kan være en udfordring at undgå infektion i såret. Inficerede sår giver problemer både for patienten og for os på afdelingen. Vi vil typisk vælge en bandage, som mindsker antallet af bakterier og sætter kroppens immunforsvar i stand til at håndtere bakteriemængden. Det fremmer helingen, giver færre bandageskift og dermed mindre risiko for infektion."*

*Sygeplejerske, hjertekirurgisk afdeling*

# Unik bandage med sølv - bekæmper bakterier, håndterer sårvæske og fremmer sårheling

AQUACEL® Ag-bandage gør det lettere at behandle sår, der er inficerede eller er i risiko for at blive det<sup>1</sup>. Sølvioner er bundet til bandagen og frigives i kontrolleret mængde ved kontakt med sårvæske og bakterier<sup>2</sup>. In vitro studier har vist hurtig og bred antimikrobiel effekt i op til 14 dage<sup>2</sup>. AQUACEL® Ag-bandage former sig efter såret<sup>3</sup>, så sølvionerne kommer i kontakt med og dræber bakterier i sårbunden. Samtidig mindskes de hulrum, hvor bakterier kan formere sig<sup>3</sup>. Ioniseret sølv er effektivt mod et bredt spektrum af kendte sårpatogener, inklusive multiresistente bakterier<sup>2</sup>. Den unikke AQUACEL® Ag-bandage absorberer sårvæske hurtigt og omdannes til en sammenhængende gel, som binder sårvæsken selv under kompression<sup>4</sup>. Bandagen er både nem at lægge på og fjerne igen<sup>5</sup> og kan sidde på i op til syv dage. Færre bandageskift<sup>4</sup> er en klar fordel for både patient, behandler og sårets helingsproces.

**Indikationer:** Tryksår, bensår, diabetiske fodsår, brandsår og kirurgiske sår.

## Til inficerede sår og sår med risiko for infektion

- **Bred, hurtig og vedvarende antimikrobiel effekt<sup>2</sup>**
- **Understøtter sårheling ved at kontrollere bakterieniveauet<sup>6</sup>**
- **Frigiver sølvioner efter behov<sup>2</sup>**
- **Optimalt sårhelingsmiljø - hurtig geldannelse<sup>4</sup>, absorption af væske, bakterier og enzymer<sup>4</sup>, dæmpet inflammation<sup>3</sup>**
- **Binder væske og bakterier selv under kompression<sup>4</sup>**
- **Bevarer sårkanterne intakt, forhindrer maceration<sup>4</sup>**

**EVIDENS  
BASERET**

**AQUACEL® Ag.**



## AQUACEL® Ag-bandager

| Størrelse  | Antal pr. æske | Varenummer |
|------------|----------------|------------|
| 5 x 5 cm   | 10 stk.        | 403706     |
| 10 x 10 cm | 10 stk.        | 403708     |
| 15 x 15 cm | 5 stk.         | 403710     |
| 20 x 30 cm | 5 stk.         | 403711     |
| 4 x 10 cm  | 10 stk.        | 403739     |
| 4 x 20 cm  | 10 stk.        | 403740     |
| 4 x 30 cm  | 10 stk.        | 403741     |

**Indhold:** AQUACEL® Ag-bandager består af unik Hydrofiber®-teknologi (natriumcarboxymetylcellulose) og 1,2 % (w/w) sølvioner.

**Indikationer:**\* AQUACEL® Ag-bandager kan anvendes som primær bandage ved moderat til kraftigt væskende inficerede sår eller til sår med øget risiko for infektion.

- Kroniske (langsomt helende) sår: Bensår, tryksår, diabetiske fodsår.
- Akutte sår: Postoperative sår, hudafskrabninger, lacerationer og delhudsbrandskader.

**Skifteinterval:** AQUACEL® Ag-bandager kan sidde på i op til 7 dage - eller skiftes, når det er klinisk indiceret. Ved behandling af overfladiske og dybe 2. grads forbrændinger kan AQUACEL® Ag-bandager sidde på i op til 14 dage.

**Opbevaring:** Ved stuetemperatur.

**Steriliseringstype:** Gammasteriliseret.

**Klassificering:** AQUACEL® Ag-bandager er CE-mærkede og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

**Holdbarhed:** 2 år.

LATEXFRIT produkt og indpakning.

\* Se brugsanvisning i emballagen for mere information.

#### Referencer:

1. Newman G. R. et al. Visualisation of bacterial sequestration and bactericidal activity within hydrating Hydrofiber® wound dressings. *Biomaterials* (27) 2006; 1129-1139.
2. Bowler P. Progression toward Healing: Wound Infection and the Role of an Advanced Silver-containing Hydrofiber® Dressing. *Ostomy Wound Management* 2003; 49(8a): 2-5.
3. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.
4. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.
5. Harding K. G. et al. Cost and Dressing Evaluation of Hydrofiber and Alginate Dressings in the Management of Community-Based Patients with Chronic Leg Ulceration. *Wounds* 2001; 13(6): 229-236.
6. Coutts P, Sibbald RG, 2005. The effect of a silver-containing Hydrofiber® dressing on superficial wound bed and bacterial balance of chronic wounds. *Int. Wound J*; 2: 348-356.