



**FR**  **CICA-CARE**◊  
Plaque de gel de silicone

Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

**Description**
Le CICA-CARE™ est une plaque de gel souple en silicone médicale, auto-adhérente, semi-occlusive, renforcée par un support en silicone.

**Indications**
CICA-CARE est conçu pour être utilisé temporairement:

1. dans les soins de cicatrices hypertrophiques ou chéloïdes anciennes ou récentes et
2. en traitement prophylactique, pour prévenir la formation d'une cicatrice hypertrophique ou chéloïde sur plaie fermée.

**Contre-indications**

Ne pas utiliser chez les patients qui présentent des facteurs médicaux aggravants susceptibles de les empêcher d'utiliser la plaque de gel correctement.

Ne pas utiliser chez des patients qui présentent des lésions dermatologiques (ex : Psoriasis & Acné), NE PAS UTILISER SUR DES PLAIES OUVERTES ou sur une peau lésée.

**Précautions**

Des rougeurs ont pu être observées chez certains patients au niveau de la peau recouverte. Cette complication peut provenir d'une hygiène insuffisante ou d'une application sous trop forte compression. En cas de rougeurs réduire le temps d'application de CICA-CARE à 12 heures par jour. Si les rougeurs persistent, arrêter l'application et consulter votre médecin. Sur les incisions chirurgicales n'utiliser CICA-CARE qu'après ablation des sutures et cicatrisation complète du site. Suivre attentivement les procédures d'acclimatation et de nettoyage.

L'utilisation de CICA-CARE n'est pas recommandée chez les jeunes enfants à moins qu'il soit utilisé en association avec un pansement secondaire approprié. Ne pas utiliser de pommades ou de crèmes sous la plaque de gel qui pourraient perturber la performance du produit.

**Complications et effets secondaires**
Les complications susceptibles de se produire avec CICA-CARE sont les suivantes:

1. macération superficielle de la peau
2. rougeurs
3. prurit.

**Mode d'emploi:**

1. Nettoyer et sécher la cicatrice et la peau périlésionnelle.
2. Ouvrir le sachet et extraire CICA-CARE sans enlever l'élément protecteur.
3. Découper un morceau pour couvrir la cicatrice en recouvrant légèrement la

**smith&nephew**

**DE**  **CICA-CARE**◊  
Silikon-Gel-Platte

Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

**Produktbeschreibung**
CICA-CARE™ ist eine weiche, selbsthaftende, semipermeable Gel-Platte aus medizinischem Silikon. Die Rückseite ist mit einer Silikon-Membran verstärkt.

**Anwendungsgebiete**
Zum zeitlich begrenzten Einsatz bei 1. der Therapie von bestehenden oder neu ausgebildeten hypertrophen oder keloidalen Narben und;

2. als Prophylaxe-Maßnahme bei chirurgisch geschlossenen Wunden, um die Ausbildung von hypertrophen oder keloidalen Narben zu vermeiden.
6. Conservar la partie non utilisée de CICA-CARE dans son emballage d'origine et dans un endroit sec (T<25° C).

**Soins particuliers**
1. Nettoyer CICA-CARE deux fois par jour dans une solution savonneuse douce et non huileuse; rincer à l'eau toute chaude (D). Sécher immédiatement et appliquer à nouveau sur la cicatrice propre et sèche. Éviter les détergents qui pourraient provoquer une irritation cutanée. Prescrire l'usage de produits à base de papier (comme par ex. les essuie-tout domestiques) pour sécher la plaque CICA-CARE, ces produits pouvant adhérer à la plaque.

**Vorsichtsmaßnahmen**
Bei einigen Patienten wurde ein Hautausschlag unter dem Verband beobachtet. Dies würde fehlender Hygiene bzw. einer zu festen Fixierung zugeschrieben. Bei Auftreten von Hautausschlag reduzieren Sie die Behandlungsdauer auf 12 Stunden, mit anschließender Ruhephase von 12 Stunden. Bei anhaltendem Ausschlag unterbrechen Sie die Behandlung und suchen Sie Ihren Arzt auf. Bei post-operativ geschlossenen Wunden sollte CICA-CARE erst nach dem Fächenziehen und dem vollständigen Verheilen der Wunde verwendet werden. Bitte befolgen Sie genau die Eingewöhnungs- und Reinigungsanweisungen. CICA-CARE sollte nicht bei Kindern unter 2 Jahren angewendet werden, es sei denn in Kombination mit einem weiteren Fixierverband. Nicht in Kombination mit Salben oder Cremes verwenden, da dies die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen kann.

**Komplikationen und Nebenwirkungen**
Risiken und Nebenwirkungen zu CICA-CARE sind:

1. Oberflächliche Mazeration der Haut hervorgerufen durch/in Zusammenhang mit der semi-okklusiven Folie
2. Hautausschlag
3. Juckreiz.

**Anplikationshinweise**
1. Säubern und Trocknen Sie die Narbe und die Umgebungshaut.
2. Nach dem Öffnen der Verpackung entnehmen Sie die einzelne Platte mit dem Schutzpapier.

Presentations			
<b>Code</b>	<b>Dimension</b>	<b>Carton</b>	
66250707	12cm x 15cm	boîte de 10	
66250706	12cm x 15cm	boîte de 1	
66250705	12cm x 6cm	boîte de 40	
66250704	12cm x 6cm	carton de 1	

**Fabricant** Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN Angletère. \*Marques déposées de Smith & Nephew ©Smith & Nephew date de révision 10/2013 www.cica-care.com

**DE**  **smith&nephew**

**DE**  **CICA-CARE**◊  
Silikon-Gel-Platte

Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.

**Produktbeschreibung**
CICA-CARE™ ist eine weiche, selbsthaftende, semipermeable Gel-Platte aus medizinischem Silikon. Die Rückseite ist mit einer Silikon-Membran verstärkt.

**Anwendungsgebiete**
Zum zeitlich begrenzten Einsatz bei 1. der Therapie von bestehenden oder neu ausgebildeten hypertrophen oder keloidalen Narben und;

2. als Prophylaxe-Maßnahme bei chirurgisch geschlossenen Wunden, um die Ausbildung von hypertrophen oder keloidalen Narben zu vermeiden.
6. Conservar la partie non utilisée de CICA-CARE dans son emballage d'origine et dans un endroit sec (T<25° C).

**Soins particuliers**
1. Nettoyer CICA-CARE deux fois par jour dans une solution savonneuse douce et non huileuse; rincer à l'eau toute chaude (D). Sécher immédiatement et appliquer à nouveau sur la cicatrice propre et sèche. Éviter les détergents qui pourraient provoquer une irritation cutanée. Prescrire l'usage de produits à base de papier (comme par ex. les essuie-tout domestiques) pour sécher la plaque CICA-CARE, ces produits pouvant adhérer à la plaque.

**Vorsichtsmaßnahmen**
Bei einigen Patienten wurde ein Hautausschlag unter dem Verband beobachtet. Dies würde fehlender Hygiene bzw. einer zu festen Fixierung zugeschrieben. Bei Auftreten von Hautausschlag reduzieren Sie die Behandlungsdauer auf 12 Stunden, mit anschließender Ruhephase von 12 Stunden. Bei anhaltendem Ausschlag unterbrechen Sie die Behandlung und suchen Sie Ihren Arzt auf. Bei post-operativ geschlossenen Wunden sollte CICA-CARE erst nach dem Fächenziehen und dem vollständigen Verheilen der Wunde verwendet werden. Bitte befolgen Sie genau die Eingewöhnungs- und Reinigungsanweisungen. CICA-CARE sollte nicht bei Kindern unter 2 Jahren angewendet werden, es sei denn in Kombination mit einem weiteren Fixierverband. Nicht in Kombination mit Salben oder Cremes verwenden, da dies die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen kann.

**Komplikationen und Nebenwirkungen**
Risiken und Nebenwirkungen zu CICA-CARE sind:

1. Oberflächliche Mazeration der Haut hervorgerufen durch/in Zusammenhang mit der semi-okklusiven Folie
2. Hautausschlag
3. Juckreiz.

**Anplikationshinweise**
1. Säubern und Trocknen Sie die Narbe und die Umgebungshaut.
2. Nach dem Öffnen der Verpackung entnehmen Sie die einzelne Platte mit dem Schutzpapier.

Handelsformen			
<b>Art-Nr.</b>	<b>Abmessung</b>	<b>Inhalt pro Originalpackung</b>	
66250707	12cm x 15cm	Packung 10 Stück	
66250706	12cm x 15cm	Packung 1 Stück	
66250705	12cm x 6cm	Packung 40 Stück	
66250704	12cm x 6cm	Packung 1 Stück	

**Hersteller** Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessel Road, Hull HU3 2BN England. \*Warenzeichen von Smith & Nephew ©Smith & Nephew Herausgabedatum 10/2013 www.cica-care.com

**smith&nephew**

**ES**  **CICA-CARE**◊  
Lámina de gel de silicona

No usar el contenido si el envase está abierto o dañado.

**Descripción**
CICA-CARE™ es un lámina de gel suave, autoadhesiva, semioclusiva compuesta de silicona de grado médico reforzada con una membrana de soporte de silicona.

**Indicaciones**
CICA-CARE está diseñada para uso temporal en:
1. el tratamiento de cicatrices existentes y de nuevas cicatrices hipertroficas y queloides.
2. Como terapia profiláctica en úlceras cerradas para ayudar a prevenir la cicatriz y la zona circundante.
6. Mantener el trozo de la lámina que no ha sido usado en el envase y conservarlo en un lugar seco (<25°C).

**Contraindicaciones**
No usar en pacientes con factores de complicación médica que impidan el uso de la lámina de gel correctamente. No usar en pacientes con enfermedades dermatológicas (por ejemplo, psoriasis y acné). No usar en heridas abiertas o en áreas donde la integridad de la piel se pueda ver comprometida.

**Precauciones**
En algunos pacientes, se ha producido una erupción en la zona tratada. Esto se ha atribuido a una higiene deficiente o bien a que el producto se ha aplicado con demasiada presión sobre la cicatriz. Si aparece una erupción, reducir el tratamiento a 12 horas al día. Si aún persistiera la erupción, se aconseja discontinuar el tratamiento y consultar con el médico. En incisiones quirúrgicas, use CICA-CARE sólo después de haber eliminado las suturas y de que ésta haya cicatrizado completamente. Seguir detenidamente las instrucciones de adaptación y lavado. No se recomienda el uso de CICA-CARE en niños pequeños a menos que se utilice en combinación con un apósito secundario de retención apropiado. No aplique ungüentos o cremas bajo la lámina de gel, ya que pueden interferir en el rendimiento del producto.

**Complicaciones y efectos adversos**
Los riesgos de complicaciones con CICA-CARE son:
1. Maceración superficial de la piel.
2. Erupciones.
3. Prurito.

**Instrucciones de uso**
1. Limpie y seque la cicatriz y la piel circundante.
2. Abra el envase, extrae la lámina CICA-CARE con su lámina protectora.

**Disponibilidad del producto**

**Complicaciones y efectos adversos**
Los riesgos de complicaciones con CICA-CARE son:
1. Maceración superficial de la piel.
2. Erupciones.
3. Prurito.

**Instrucciones de uso**
1. Limpie y seque la cicatriz y la piel circundante.
2. Abra el envase, extrae la lámina CICA-CARE con su lámina protectora.

**Disponibilità del prodotto**

**Complicaciones y efectos adversos**
Los riesgos de complicaciones con CICA-CARE son:
1. Maceración superficial de la piel.
2. Erupciones.
3. Prurito.

**smith&nephew**

**ES**  **CICA-CARE**◊  
Lámina de gel de silicona

No usar el contenido si el envase está abierto o dañado.

**Descripción**
CICA-CARE™ es un lámina de gel suave, autoadhesiva, semioclusiva compuesta de silicona de grado médico reforzada con una membrana de soporte de silicona.

**Indicaciones**
CICA-CARE está diseñada para uso temporal en:
1. el tratamiento de cicatrices existentes y de nuevas cicatrices hipertroficas y queloides.
2. Como terapia profiláctica en úlceras cerradas para ayudar a prevenir la cicatriz y la zona circundante.
6. Mantener el trozo de la lámina que no ha sido usado en el envase y conservarlo en un lugar seco (<25°C).

**Contraindicaciones**
No usar en pacientes con factores de complicación médica que impidan el uso de la lámina de gel correctamente. No usar en pacientes con enfermedades dermatológicas (por ejemplo, psoriasis y acné). No usar en heridas abiertas o en áreas donde la integridad de la piel se pueda ver comprometida.

**Precauciones**
En algunos pacientes, se ha producido una erupción en la zona tratada. Esto se ha atribuido a una higiene deficiente o bien a que el producto se ha aplicado con demasiada presión sobre la cicatriz. Si aparece una erupción, reducir el tratamiento a 12 horas al día. Si aún persistiera la erupción, se aconseja discontinuar el tratamiento y consultar con el médico. En incisiones quirúrgicas, use CICA-CARE sólo después de haber eliminado las suturas y de que ésta haya cicatrizado completamente. Seguir detenidamente las instrucciones de adaptación y lavado. No se recomienda el uso de CICA-CARE en niños pequeños a menos que se utilice en combinación con un apósito secundario de retención apropiado. No aplique ungüentos o cremas bajo la lámina de gel, ya que pueden interferir en el rendimiento del producto.

**Complicaciones y efectos adversos**
Los riesgos de complicaciones con CICA-CARE son:
1. Maceración superficial de la piel.
2. Erupciones.
3. Prurito.

**Instrucciones de uso**
1. Limpie y seque la cicatriz y la piel circundante.
2. Abra el envase, extrae la lámina CICA-CARE con su lámina protectora.

**Disponibilità del prodotto**

**Complicaciones y efectos adversos**
Los riesgos de complicaciones con CICA-CARE son:
1. Maceración superficial de la piel.
2. Erupciones.
3. Prurito.

**Instrucciones de uso**
1. Limpie y seque la cicatriz y la piel circundante.
2. Abra el envase, extrae la lámina CICA-CARE con su lámina protectora.

**Disponibilità del prodotto**

**Complicaciones y efectos adversos**
Los riesgos de complicaciones con CICA-CARE son:
1. Maceración superficial de la piel.
2. Erupciones.
3. Prurito.

**smith&nephew**

**IT**  **CICA-CARE**◊  
Foglio in gel di silicone

Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

**Descrizione**
CICA-CARE™ è un foglio morbido, auto-adeseivo e semi-occlusivo costituito da silicone medicale rinforzato da una membrana in silicone di supporto.

**Destinazione d'uso**
CICA-CARE è indicato per uso temporaneo:
1. nel trattamento di preesistenti o nuove cicatrici ipertrofiche e cheloidi
2. come trattamento di prevenzione su ferite chirurgiche per prevenire cicatrici ipertrofiche e cheloidi.

**Controindicazioni**
Non utilizzare su pazienti con complicatezze cliniche che li possano rendere incapaci di utilizzare correttamente il foglio in gel. Non utilizzare su pazienti con patologie dermatologiche (ad esempio psoriasi e acne). NON UTILIZZARE SU FERITE APERTE o dove l'integrità della cute sia compromessa.

**Precauzioni**

In alcuni pazienti, è stata osservata un'irritazione della cute coperta dal prodotto. Ciò è stato attribuito ad una igiene insufficiente o a un'eccessiva pressione del prodotto sulla cute. Nel caso comparisse un'irritazione cutanea, ridurre il trattamento con CICA-CARE a 12 ore seguite da 12 ore di riposo. Se l'irritazione cutanea persiste, interrompere il trattamento e rivolgersi al proprio medico. Su incisioni chirurgiche, utilizzare CICA-CARE solo dopo la rimozione dei punti di sutura e quando la sede sia completamente guarita. Seguire con attenzione le procedure di acclimatazione e di lavaggio. L'uso di CICA-CARE non è raccomandato nei bambini piccoli a meno che non sia usato in combinazione con un'appropriata medicazione secondaria. Non utilizzare unguenti o creme sotto il foglio in gel, in quanto potrebbero interferire con le prestazioni del prodotto.

**Complicazioni e eventi avversi**
I possibili rischi e complicazioni con CICA-CARE sono:
1. macerazione superficiale della cute
2. irritazione
3. prurito.

**Instruzioni per l'uso:**
1. Pulire e asciugare la cicatrice e la cute circostante.
2. Aprire la confezione con tecnica "peel open" ed estrarre il foglio CICA-CARE con la sua carta protettiva posteriore.
3. Tagliare un pezzo per coprire la cicatrice in modo che si sovrapponga

**Disponibilità del prodotto**

**Complicazioni e eventi avversi**
I possibili rischi e complicazioni con CICA-CARE sono:
1. macerazione superficiale della cute
2. irritazione
3. prurito.

**Instruzioni per l'uso:**
1. Pulire e asciugare la cicatrice e la cute circostante.
2. Aprire la confezione con tecnica "peel open" ed estrarre il foglio CICA-CARE con la sua carta protettiva posteriore.
3. Tagliare un pezzo per coprire la cicatrice in modo che si sovrapponga

**Disponibilità del prodotto**

**Complicazioni e eventi avversi**
I possibili rischi e complicazioni con CICA-CARE sono:
1. macerazione superficiale della cute
2. irritazione
3. prurito.

**smith&nephew**

**IT**  **CICA-CARE**◊  
Foglio in gel di silicone

Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

**Descrizione**
CICA-CARE™ è un foglio morbido, auto-adeseivo e semi-occlusivo costituito da silicone medicale rinforzato da una membrana in silicone di supporto.

**Destinazione d'uso**
CICA-CARE è indicato per uso temporaneo:
1. nel trattamento di preesistenti o nuove cicatrici ipertrofiche e cheloidi
2. come trattamento di prevenzione su ferite chirurgiche per prevenire cicatrici ipertrofiche e cheloidi.

**Controindicazioni**
Non utilizzare su pazienti con complicatezze cliniche che li possano rendere incapaci di utilizzare correttamente il foglio in gel. Non utilizzare su pazienti con patologie dermatologiche (ad esempio psoriasi e acne). NON UTILIZZARE SU FERITE APERTE o dove l'integrità della cute sia compromessa.

**Precauzioni**

In alcuni pazienti, è stata osservata un'irritazione della cute coperta dal prodotto. Ciò è stato attribuito ad una igiene insufficiente o a un'eccessiva pressione del prodotto sulla cute. Nel caso comparisse un'irritazione cutanea, ridurre il trattamento con CICA-CARE a 12 ore seguite da 12 ore di riposo. Se l'irritazione cutanea persiste, interrompere il trattamento e rivolgersi al proprio medico. Su incisioni chirurgiche, utilizzare CICA-CARE solo dopo la rimozione dei punti di sutura e quando la sede sia completamente guarita. Seguire con attenzione le procedure di acclimatazione e di lavaggio. L'uso di CICA-CARE non è raccomandato nei bambini piccoli a meno che non sia usato in combinazione con un'appropriata medicazione secondaria. Non utilizzare unguenti o creme sotto il foglio in gel, in quanto potrebbero interferire con le prestazioni del prodotto.

**Complicazioni e eventi avversi**
I possibili rischi e complicazioni con CICA-CARE sono:
1. macerazione superficiale della cute
2. irritazione
3. prurito.

**Instruzioni per l'uso:**
1. Pulire e asciugare la cicatrice e la cute circostante.
2. Aprire la confezione con tecnica "peel open" ed estrarre il foglio CICA-CARE con la sua carta protettiva posteriore.
3. Tagliare un pezzo per coprire la cicatrice in modo che si sovrapponga

**Disponibilità del prodotto**

**Complicazioni e eventi avversi**
I possibili rischi e complicazioni con CICA-CARE sono:
1. macerazione superficiale della cute
2. irritazione
3. prurito.

**Instruzioni per l'uso:**
1. Pulire e asciugare la cicatrice e la cute circostante.
2. Aprire la confezione con tecnica "peel open" ed estrarre il foglio CICA-CARE con la sua carta protettiva posteriore.
3. Tagliare un pezzo per coprire la cicatrice in modo che si sovrapponga

**Disponibilità del prodotto**

**Complicazioni e eventi avversi**
I possibili rischi e complicazioni con CICA-CARE sono:
1. macerazione superficiale della cute
2. irritazione
3. prurito.

**smith&nephew**

**NL**  **CICA-CARE**◊  
Siliconen gelsheet

Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.

**Beschrijving**
CICA-CARE™ gelsheet is een flexibele, éénzijdig klevende gelsheet, gemaakt van medische kwaliteit siliconengel, verstevigd met een siliconenmembraan in de bovenlaag.

**Indicaties**
CICA-CARE is primair geïndiceerd voor:
1. therapie van bestaande en nieuwe hypertrofische littekens of keloiden,
2. preventie tegen optreden van hypertrofische littekens of keloiden bij gesloten wonden.

**Contra-indicaties**
Niet gebruiken op patiënten met gecompliceerde medische factoren waarvoor zij ongeschikt zijn voor de eigenschappen van de gelsheet. Niet gebruiken op patiënten met dermatologische aandoeningen (bv Psoriasis & Acne). NIET GEbruIKEN OP OPEN WONDEN of een huid die is aangetast.

**Contra-indicaties**

Niet gebruiken op patiënten met gecompliceerde medische factoren waarvoor zij ongeschikt zijn voor de eigenschappen van de gelsheet. Niet gebruiken op patiënten met dermatologische aandoeningen (bv Psoriasis & Acne). NIET GEbruIKEN OP OPEN WONDEN of een huid die is aangetast.

**Voorzorgsmaatregelen**

Bij sommige patiënten is uitslag waargenomen op de bedekte huid. Dit wordt toegeschreven aan ofwel slechte hygiëne of een te strak aangebrachte gelsheet. Mocht er uitslag verschijnen, verminder dan het CICA-CARE gebruik met 12 uur behandeling gevolgd door 12 uur rust. Mocht de uitslag aanhouden, stop dan met de behandeling en raadpleeg een arts. Gebruik pas op chirurgische incisies wanneer de hechtingen zijn verwijderd. Volg acclimatisatie- en wasprocedures zorgvuldig op. Het gebruik van CICA-CARE wordt niet aanbevolen voor jonge kinderen tenzij het wordt gebruikt in combinatie met een geschikt secundair fixatieverband. Gebruik geen zalf of crèmes onder de gelsheet omdat deze de prestaties van het product kunnen beïnvloeden.

**Complicaties en bijwerkingen**
De risico's en complicaties met CICA-CARE zijn:

1. Oppervlakkige maceratie van de huid
2. Irritatie
3. Juk.

**Gebruiksaanwijzing**

1. Reinig en droog het litteken en de omliggende huid.
2. Open de verpakking en neem CICA-CARE inclusief het wit-rode beschermepapier, uit de verpakking.
3. Knip CICA-CARE op maat in de vorm en de grootte van het litteken met een kleine overlap over de omliggende huid (A). Laet de gelsheet aan alle kanten 1cm over het litteken uitsteken. Bij grotere littekens kunnen meerdere gelsheets naast elkaar worden gebruikt. Voor eenvoudige verwijdering, zorg ervoor dat het geknipte stuk een gedeelte van het beschermepapier met verwijderingsgedeelte bevat.
4. Verwijder het wit-rode beschermepapier en leg CICA-CARE met de klevende zijde op het litteken zonder uit te rekken (B, C).
5. Sebbene sia auto-adeseivo, CICA-CARE può anche essere mantenuto in posizione da un bendaggio flessibile lievemente elastico o da un nastro come OPSITE® Flexifix o PRIMAFIX®. Fare attenzione a non stringere troppo la medicazione contro la cicatrice perché ciò può provocare un'irritazione della cicatrice stessa e dell'area circostante.
6. Mantenere la porzione inutilizzata del foglio nella confezione originale e conservare in luogo asciutto (<25°C).

**Complicaties en bijwerkingen**
De risico's en complicaties met CICA-CARE zijn:

**Gebruiksaanwijzing**

**Complicaties en bijwerkingen**
De risico's en complicaties met CICA-CARE zijn:

**smith&nephew**

**NL**  **CICA-CARE**◊  
Siliconen gelsheet

Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is.

**Beschrijving**
CICA-CARE™ gelsheet is een flexibele, éénzijdig klevende gelsheet, gemaakt van medische kwaliteit siliconengel, verstevigd met een siliconenmembraan in de bovenlaag.

**Indicaties**
CICA-CARE is primair geïndiceerd voor:
1. therapie van bestaande en nieuwe hypertrofische littekens of keloiden,
2. preventie tegen optreden van hypertrofische littekens of keloiden bij gesloten wonden.

**Contra-indicaties**
Niet gebruiken op patiënten met gecompliceerde medische factoren waarvoor zij ongeschikt zijn voor de eigenschappen van de gelsheet. Niet gebruiken op patiënten met dermatologische aandoeningen (bv Psoriasis & Acne). NIET GEbruIKEN OP OPEN WONDEN of een huid die is aangetast.

**Contra-indicaties**

Niet gebruiken op patiënten met gecompliceerde medische factoren waarvoor zij ongeschikt zijn voor de eigenschappen van de gelsheet. Niet gebruiken op patiënten met dermatologische aandoeningen (bv Psoriasis & Acne). NIET GEbruIKEN OP OPEN WONDEN of een huid die is aangetast.

**Voorzorgsmaatregelen**

Bij sommige patiënten is uitslag waargenomen op de bedekte huid. Dit wordt toegeschreven aan ofwel slechte hygiëne of een te strak aangebrachte gelsheet. Mocht er uitslag verschijnen, verminder dan het CICA-CARE gebruik met 12 uur behandeling gevolgd door 12 uur rust. Mocht de uitslag aanhouden, stop dan met de behandeling en raadpleeg een arts. Gebruik pas op chirurgische incisies wanneer de hechtingen zijn verwijderd. Volg acclimatisatie- en wasprocedures zorgvuldig op. Het gebruik van CICA-CARE wordt niet aanbevolen voor jonge kinderen tenzij het wordt gebruikt in combinatie met een geschikt secundair fixatieverband. Gebruik geen zalf of crèmes onder de gelsheet omdat deze de prestaties van het product kunnen beïnvloeden.

**Complicaties en bijwerkingen**
De risico's en complicaties met CICA-CARE zijn:

1. Oppervlakkige maceratie van de huid
2. Irritatie
3. Juk.

**Gebruiksaanwijzing**

1. Reinig en droog het litteken en de omliggende huid.
2. Open de verpakking en neem CICA-CARE inclusief het wit-rode beschermepapier, uit de verpakking.
3. Knip CICA-CARE op maat in de vorm en de grootte van het litteken met een kleine overlap over de omliggende huid (A). Laet de gelsheet aan alle kanten 1cm over het litteken uitsteken. Bij grotere littekens kunnen meerdere gelsheets naast elkaar worden gebruikt. Voor eenvoudige verwijdering, zorg ervoor dat het geknipte stuk een gedeelte van het beschermepapier met verwijderingsgedeelte bevat.
4. Verwijder het wit-rode beschermepapier en leg CICA-CARE met de klevende zijde op het litteken zonder uit te rekken (B, C).
5. Sebbene sia auto-adeseivo, CICA-CARE può anche essere mantenuto in posizione da un bendaggio flessibile lievemente elastico o da un nastro come OPSITE® Flexifix o PRIMAFIX®. Fare attenzione a non stringere troppo la medicazione contro la cicatrice perché ciò può provocare un'irritazione della cicatrice stessa e dell'area circostante.
6. Mantenere la porzione inutilizzata del foglio nella confezione originale e conservare in luogo asciutto (<25°C).

**Complicaties en bijwerkingen**
De risico's en complicaties met CICA-CARE zijn:

**Gebruiksaanwijzing**

**Complicaties en bijwerkingen**
De risico's en complicaties met CICA-CARE zijn:

**smith&nephew**