



"Bandagen må bare ikke gå i stykker, når den fjernes"

"Flere af vores patienter har temmelig store, meget smertefulde sår. Derfor er det en prøvelse både for patienten og os, hver gang vi skal skifte bandage. Allerbedst er det selvfølgelig, når bandagen er let at håndtere uden brug af instrumenter og bare kan fjernes i ét stykke."

Sygeplejerske, kirurgisk afdeling

Til svært håndterbare sår - let at fjerne i ét stykke

AQUACEL® Extra™-bandage giver optimal sårheling¹ ved dybe sår, dybe kavitetssår og kraftigt væskende sår. Her er ekstra trækstyrke og ekstra absorption af stor betydning. AQUACEL® Extra™-bandage absorberer sårveske hurtigt og omdannes til en sammenhængende gel, som binder sårvesken selv under kompression.¹ Bandagen er nem at lægge på og fjerne igen² og kan sidde på i op til syv dage. Til gavn for både behandler, patient og sårets helingsproces.

Bemærk: Forstærkede fibre giver sikkerhed for, at bandagen kan fjernes i ét stykke.

Indikationer: Tryksår, bensår, diabetiske fodsår, brandsår og kirurgiske sår.

Med ekstra trækstyrke og ekstra absorption

- **Til svært håndterbare sår med behov for ekstra trækstyrke og ekstra absorption**
- **Optimalt sårhelingsmiljø - hurtig geldannelse¹, absorption af væske, bakterier og enzymer¹, dæmpet inflammation³**
- **Binder væske og bakterier - også under kompression¹**
- **Bevarer sårkanterne intakt, forhindrer maceration¹**
- **One-piece-removal (let at fjerne i ét stykke)**

**EVIDENS
BASERET**

AQUACEL®
Extra™



AQUACEL® Extra™-bandager

Størrelse	Antal pr. æske	Varenummer
5 x 5 cm	10 stk.	420671
10 x 10 cm	10 stk.	420672
15 x 15 cm	5 stk.	420673

Indhold: AQUACEL® Extra™-bandager består af unik Hydrofiber®-teknologi (natriumcarboxymethylcellulose) samt forstærkede cellulosefibre.

Indikationer:* AQUACEL® Extra™-bandager kan anvendes som primær bandage ved moderat til kraftigt væskende sår, hvor ekstra trækstyrke og absorption er påkrævet.

- Kroniske (langsomt helende) sår: Bensår, tryksår, diabetiske fodsår.
- Akutte sår: Delhudstransplantater, hudafskrabninger, lacerationer, postoperative sår og delhudsbrandskader.

Skifteinterval: Skift bandage, når det er klinisk indiceret. Bandagen kan sidde på i op til 7 dage.

Opbevaring: Ved stuetemperatur.

Steriliseringstype: Gammasteriliseret.

Klassificering: AQUACEL® Extra™-bandager er CE-mærkede og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

Holdbarhed: 5 år i uåbnet emballage.

LATEXFRIT produkt og indpakning.

*Se brugsanvisning i emballagen for mere information.

Referencer:

1. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.
2. Harding K. G. et al. Cost and Dressing Evaluation of Hydrofiber and Alginate Dressings in the Management of Community-Based Patients with Chronic Leg Ulceration. *Wounds* 2001; 13(6): 229-236.
3. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.