



"Nogle sår kræver en ekstra skånsom behandling"

"Nogle af de sår, jeg behandler, er så følsomme, at man næsten ikke kan få lov at røre dem. I de tilfælde skal bandagen være meget nem og hurtig at skifte. Den skal helst kunne sidde i tre-fire dage, men uden at der opstår maceration. Den skal også kunne holde på sårvæsken under tryk, da kompressionsbehandling ofte er en del af sårbehandlingen."

Sygeplejerske, plastikkirurgisk afdeling

AQUACEL® Foam-bandage

Blød og fleksibel bandage til skånsom sårheling

Skumbandage til behandling af overfladiske og væskende sår

- Skumbandage med AQUACEL® bandagens fordele
- AQUACEL® bandagens sårhelende egenskaber direkte på såret
- Enkel at anvende
- Ekstra blød og fleksibel
- Optimalt sårhelingsmiljø med dæmpet inflammation¹, hurtig geldannelse² og absorption og retention af væske, bakterier og enzymer²
- Binder og retinerer væske og bakterier - også under kompression²
- Bevarer sårkanterne intakte, forhindrer maceration²



Indikationer: Tryksår, bensår, diabetiske fodsår, kirurgiske sår og lacerationer.

AQUACEL® Foam-bandage findes også i en version med sølv til inficerede sår og sår med risiko for infektion.

AQUACEL®
Foam



AQUACEL® Foam

	Størrelse	Max sårstørrelse	Antal pr. æske	Varenummer
bandager - uden klæber	5 x 5 cm		10 stk.	420631
	10 x 10 cm		10 stk.	420633
	15 x 15 cm		5 stk.	420635
	20 x 20 cm		5 stk.	420636
	15 x 20 cm		5 stk.	420637
bandager - med silikoneklæber	8 x 8 cm	3 x 3 cm	10 stk.	420804
	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10 stk.	420680
	12,5 x 12,5 cm	6,5 x 6,5 cm	10 stk.	420619
	17,5 x 17,5 cm	11,5 x 11,5 cm	10 stk.	420621
	21 x 21 cm	15 x 15 cm	5 stk.	420623
	25 x 30 cm	19 x 24 cm	5 stk.	420624
hælbandage - med silikoneklæber	19,8 x 14 cm	12 x 7 cm	5 stk.	420625
sakralbandage - med silikoneklæber	20 x 16,9 cm	11,5 x 9,5 cm	5 stk.	420626

Indhold: AQUACEL® Foam-bandager er sterile sårbandager, som består af et ydre lag polyurethanfilm, et absorberende lag polyurethanskum og et sårkontaktag af Hydrofiber®-teknologi (natriumcarboxymethylcellulose).

Indikationer:* AQUACEL® Foam-bandager kan anvendes som primær bandage og som sekundær bandage i kombination med AQUACEL®, AQUACEL® Extra, AQUACEL® Ag og AQUACEL® kavitetsbandage ved behandling af væskende sår.

- Kroniske (langsomt helende) sår: Bensår, tryksår, diabetiske fodsår.
- Akutte sår: Kirurgiske sår (postoperative incisioner, sekundært helende sår og/eller donorsteder), delhudsbrandskader, traumatiske skader (hudafskrabninger og lacerationer).

Skifteinterval: AQUACEL® Foam-bandager kan sidde på i op til 7 dage - eller skiftes, når det er klinisk indiceret.

Opbevaring: Ved stuetemperatur.

Steriliseringsmetode: Gassteriliseret med etylenoxid.

Klassificering: AQUACEL® Foam-bandager er CE-mærkede og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

Holdbarhed: 2 år.

LATEXFRIT produkt og indpakning.

* Se brugsanvisning i emballagen for mere information.

Referencer:

1. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.
2. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.