

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

KLYX®

1+250 mg/ml rektalvæske, opløsning

Docusatnatrium + sorbitol

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Klyx® uden recept. For at opnå de bedste resultater, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Klyx®. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Klyx®.
3. Sådan skal du bruge Klyx®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Klyx® er et afføringsmiddel, der indføres i endetarmen.

Klyx® virker ved at øge vandindholdet i afføringen. Hård afføring bliver blød, og afføringen lettes.

Du kan bruge Klyx® ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation eller undersøgelse af tarmen.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Klyx® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Klyx®

Brug ikke Klyx®

- Hvis du er overfølsom over for docusatnatrium og sorbitol, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- Hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen.
- Hvis du har smerter i maven af ukendt årsag.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Klyx®

Du må kun bruge Klyx® i kortere tid. Hvis du bruger Klyx® i længere tid, kan du komme til at lide af mangel på vand eller salte og skader på tarmslimhinden.

Du må ikke bruge afføringsmidler, der indføres i tarmen, hvis du har blødninger eller betændelse i tarmen, med mindre det er din læge der har sagt at du skal anvende Klyx® før undersøgelse.

Tal med din læge hvis du har hæmorrhoider eller rifter ved endetarmen.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager andre afføringsmidler, da det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af dem.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du kan bruge Klyx® under graviditet, men anden afførende medicin er mere velegnet. Tal med din læge.
- Du kan bruge Klyx® i forbindelse med fødsel.

Amning:

- Du kan bruge Klyx®, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Klyx® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Klyx®

Denne medicin indeholder konserveringsmidlerne methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216). De kan give allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Klyx®

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Du kan bruge 120 ml eller 240 ml, hvis det er nødvendigt.

Børn:

Du må ikke bruge Klyx® til børn.

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Klyx® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Klyx®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Klyx®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Brugsanvisning

Før du bruger KLYX, kan du opvarme flasken i vandbad til kroppens temperatur.

Hvis virkningen af KLYX er for stærk eller for svag, så henvend dig til din læge eller til apoteket.

1. For at beskytte studsens, er studsens på flasken forsynet med en hætte (figur 1).



2. Tag hættens af ved at hive med tilstrækkelig kraft (figur 2).



3. Drej den yderste del af spidsen af (figur 3).



4. Nu er produktet klar til brug (figur 4).



5. Smør spidsen enten med vaseline eller ved at presse et par dråber KLYX ud.
6. Læg dig ned på venstre side med bøjede ben.
7. Før spidsen forsigtigt ind i endetarmen og pres langsomt væsken ud (figur 5).



⑤

8. Træk spidsen ud, mens beholderen stadig er sammenpresset.
9. Forsøg at holde væsken i tarmen i ca. 5-10 minutter.
Der vil normalt være lidt væske tilbage i flasken efter brug.

4. Bivirkninger

Klyx® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse specielt hos børn (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Nældefeber.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Mangel på salte i blodet efter længere tids brug (elektrolyttab).
- Irritation i endetarmen ved længere tids brug.
- Smerter og blødning fra endetarmen.
- Mavesmerter.
- Utilpashed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Klyx® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Klyx® ved temperaturer over 25 °C.
- Brug ikke Klyx® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Klyx® 1+250 mg/ml rektalvæske, opløsning indeholder:

Docusatnatrium 1 mg/ml og sorbitol 250 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer:

Methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), natriumhydroxid, saltsyre og rensset vand.

Pakningsstørrelser:

Klyx® 1+250 mg/ml rektalvæske, opløsning fås i pakninger med 120 ml, 10x120 ml, 240 ml og 10x240 ml.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.



307950103

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700