

Nutrison Powder

Fuldgyldig sondeernæring eller berigelsespulver, som kan anvendes til at øge madens energi- og næringsindhold. Fiberfri. Glutenfri. Laktosefattig.

Nutrison Powder røres ud i vand til en fuldgyldig og afbalanceret sondeernæring eller anvendes som berigelse i mad, f.eks. flydende eller tyktflydende mad som suppe, sauce, kartoffelmos og grød.



Vareinformation

	Nutricia varenummer	Abena varenummer	Salgsenhed
Nutrison Powder	117265	293511	6 x 860 g dåse

Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Skal anvendes i samråd med læge eller klinisk diætist.

		Pr. 100 g	Pr. 100 ml blandings (21,5 g pulver)			Pr. 100 g	Pr. 100 ml blandings (21,5 g pulver)	
ENERGI	kJ	1940	415	VITAMINER	A	µg RE	381	83
	kcal	462	100		Carotenoider	mg	0,91	0,20
					D	µg	3,3	0,71
FEDT	g	18,2	4,0	E	mg α-TE	5,9	1,3	
Mættet	g	7,9	1,7	K	µg	24	5,3	
MCT	g	-	-	B ₁	mg	0,69	0,15	
monoumættet	g	6	1,3	B ₂	mg	0,74	0,16	
polyumættet	g	3,3	0,7	Niacin	mg-NE	8,3	1,8	
linolsyre	g	2,9	0,62	Pantothersyre	mg	2,5	0,53	
α-linolensyre	g	0,5	0,11	B ₆	mg	0,79	0,17	
(n-6)/(n-3) ratio			5,7	Folsyre	µg	123	27	
KULHYDRAT	g	56,4	12	B ₁₂	µg	0,98	0,21	
sukkerarter	g	8,7	1,9	Biotin	µg	24	5,3	
laktose	g	<0,14	<0,03	C	mg	60	13	
polysakkarider	g	46,3	10,0	Cholin	mg	156	34	
stivelse	g	-	-					
KOSTFIBRE	g	-	-	ENERGIFORDELING				
PROTEIN	g	18,1	3,9	Fedt	E%	35,6	35,6	
nitrogen	g	2,90	0,62	Kulhydrat	E%	48,7	48,7	
kasein	g	18,1	4,0	Protein	E%	15,7	15,7	
N:Non protein energy		1:134	1:134					
MINERALER				VAND	ml		85	
Salt	g	1,17	0,26	Osmolaritet	mOsmol/l		320	
Natrium	mg	469	102	Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		380	
Kalium	mg	705	153	Potential Renal				
Klorid	mg	578	126	Solute Load	mOsmol/l		363	
Calcium	mg	371	81	PH værdi	pH		6,8	
Phosphor	mg	337	73					
Magnesium	mg	107	23					
Jern	mg	7,4	1,6					
Zink	mg	5,6	1,2					
Kobber	mg	0,83	0,18					
Mangan	mg	1,5	0,33					
Fluor	mg	0,5	0,10					
Molybdæn	µg	48	10					
Selen	µg	26	5,6					
Chrom	µg	25	5,5					
Jod	µg	61	13					

Glukosesirup, kaseinat (fra **komælk**), vegetabiliske olier (palmekerne-, kokos-, raps- og solsikkeolie), kaliumcitrat, natriumcitrat, natriumklorid, emulgator (**soja**lecithin), magnesiumhydrogenfosfat, kaliumhydrogenfosfat, magnesiumklorid, cholinklorid, calciumcarbonat, calciumfosfat, natrium L-askorbat, aroma, jernsulfat, L-askorbinsyre, zinksulfat, magnesiumcitrate, DL- α -tocopherylacetat, mangansulfat, nicotinamid, D-biotin, kobbersulfat, calcium-D-pantothenate, pteroylmonoglutaminsyre, natriumflourid, DL- α -tocopherol, thiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, carotenoider (indeholder **soja**) (lycopen, lutein), retinylpalmitat, riboflavin, cyanocobalamin, cholecalciferol, chromklorid, natriummolybdat, kaliumiodid, natriumselenit, phytomenadion.

Pulver til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring. Anvendes som sondeernæring eller til berigelse af fødevarer.

Hæld 85 ml kogt, afkølet vand i en ren beholder. Tilsæt 21,5 g Nutrison Powder og rør rundt indtil pulveret er opløst.

Der bruges 77,5 ml kogt, afkølet vand til 32,3 g Nutrison Powder.

Ernæringstilskud: 20 g pulver til-sættes til 1 portion flydende eller tykflydende kost. Eller som anbefalet af læge eller diætist.

Uegnet til spædbørn, patienter med galaktosæmi eller intolerance mod et eller flere af produktets ingredienser.

Anvendes med forsigtighed til børn i alderen 1-6 år. Må ikke anvendes intravenøst.

Enteral ernæringspumpe (Sonde-ernæring) anbefales. Ved brug af gravity set bør anvendes $ch \geq 8$.

24 måneder fra produktionsdato.
Åbnede dåser bør anvendes
indenfor 6 uger. Holdbarhedsdato
fremgår af pakningen.

Uåbnede dåser opbevares tørt og mellem 5-25° C. Åbnede dåser opbevares ved stuetemperatur. Færdigblandet Nutrison Powder som sondeernæring opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Aseptisk tilberedt ernæring kan hænge max. 4 timer ved stuetemperatur.

